

# Afrikansk hvidbuget dværgpindsvin



## **Pasningsvejledning for afrikansk hvidbuget dværgpindsvin**

### **DYREART**

Afrikansk hvidbuget/firetået (dværg/pygmæ) pindsvin (*Atelerix albiventris*)

### **FULDVOKSEN STØRRELSE**

Pindsviner bliver 15-25 cm langt og vejer ca. 300-900 g.  
Hunnerne er typisk større endhannerne.

### **FORVENTET LEVEALDER**

I naturen lever pindsvinet som regel ikke mere end 3 år. I fangenskab bliver de typisk 6-10 år.

### **STØRRELSE OG INDRETNING AF ANLÆG ELLER BUR**

Pindsvinet er nataktiv og lever solitært (alene). I fangenskab bør der holdes flere sammen. De sover om dagen i mørke hulrum. Pindsvinene holdes bedst i et terrarium, der er åbent ovenfor for at sikre tilstrækkelig ventilation. Et tremmebur skal sikres mod træk, og rumtemperaturen skal være stabil. Anlægget skal være rektangulært med mindst 1 m<sup>2</sup> pr. individ - men meget gerne større.

Som bundlag skal bruges støvfritmateriale, som jord, ugødet spagnum, støvfri spåner, træflis eller bark (gerne en blanding). Det skal lægges i et tykt lag, så de kan snuse og rode rundt heri. Hvert individ skal have et skjul (træerødder, sten, træstumper, hule stammer, rør, redekasser), og helst flere forskellige at vælge imellem. Som redemateriale gives halm, hø, tørre blade, smågrene, tørv m.v.. De sovende pindsvin må ikke forstyrres om dagen, da det stresser dem.

### **SÆRLIGE PASNINGSBEHOV, KRAV TIL TEMPERATURFORHOLD**

Pindsvin er meget følsomme over for træk og kulde, så det er vigtigt at anlægget er sikret. De må ikke stå i direkte sollys uden skjulemuligheder. Temperaturen skal være 20-29 °C.. Lavere og højere temperatur kan udløse dvale eller en dvalelignende tilstand, hvor dyrenes aktivitet og fødeindtag reduceres .

Foderrester og ekskrementer skal fjernes dagligt samt frisk vand (på flaske, hvis de er vænnet her-til, ellers i en tung skål). Det skal helst gives når dyret er vågent, så det ikke forstyrres i søvnen. Bundlaget skiftes efter behov afhængigt af typen. Efter rengøringen vil pindsvinene ofte smøre burets inventar og sig selv med sig selv i eget spyt.

### **STIMULERING OG BEHOV FOR MOTION**

Gem og nedgrav føde forskellige steder i buret, så deres lugtesans stimuleres og de aktiveres ved at søge, rode og grave efter det. Sten, rødder og træstumper kan med et tykt bundlag stimulerer dem til at grave skjulesteder til sig selv.

Pindsvinet er et meget aktivt dyr, som bevæger sig hurtigt i nature og ofte flere kilometer på én nat. Deres behov for motion tilgodeses ved at have et stort grundareal, smågrene, træstumper, rødder og sten, som dyrene nødsages til at klatre på, f.eks. for at få fat i føden. Tamme individer kan tages ud underopsyn, så de kan undersøge nye ting. Pindsvin (aldrig sovende) løftes forsigtigt med skålformedehænder.



### **FODRING**

Pindsvinet har brug for en varieret kost med en daglig blanding af god kvalitets universalfoder og evt. kattetørfoder (max 12 % fedt, min 30 % protein, fiberindhold ca. 10 %), kød, mus, insekter, regnorme, melorme, voksmøllarver og/eller et hårdkogt æg. Det hele kan suppleres ved, at give lidt vasket frugt (f.eks. æble, banan, pære, blomme, mango, jordbær) og/eller kogte grøntsager (gulrødder, kartofler, ærter, majs og bønner).

Det frarådes på det kraftigste, at avocado, mælk og mælkeholdrige produkter aldrig må gives, da pindsvinene ikke kan tåle det! Herunder gælder det også for (poppede) ris og korn, som man skal holde øje med. Det kan findes i visse "pindsvinefoder". Sød frugt, rosiner og figenstykker må kun gives som en lille godbid. Vitaminer gives i pulverform via foderet. Pindsvinene skal altid have adgang til foder og vand. Specielt må dette aldrig løbe tør hos diegivende hunner, da de ellers kan finde på at æde ungerne.

### **SOCIALE BEHOV**

I naturen lever pindsvinene typisk alene. De kommunikerer med hinanden primært via lugt og lyd bl.a. brummen, grynt og "kvidren" hos veltilpasset individer. Hvis fnys, hvæs og skrig, kan det betyde et aggressivt/utilpasset individer.

I fangenskab er det ofte bedst at holde hanner sammen. Voksne hanner, der er fremmede for hinanden, vil højst sandsynligt slås og kan ikke holdes sammen i mindre anlæg. Hanner der er opvokset sammen, kan holdes i ungarlegrupper uden nogen hanner. Det er altid vigtigt at holde øje med, om parret/gruppen trives, og hvis ikke, skal man være klar til at skille dem ad i hvert deres anlæg. Holdes et pindsvin alene, skal det på anden vis have social kontakt med en artsfælle (f.eks. ved et opdelt anlæg). Det giver den mulighed for at udvise naturlig social adfærd uden, at skade modparten eller selv at komme til skade.

### **FORMERING, YNGLEPLEJE OG NEUTRALISATION**

Pindsvinen yngler hovedsageligt i naturen under regnsæsonen, men der yngledygtige året rundt. De får typisk 1-2 kuld om året. Den optimale alder for hunnens første parring er knap et år (mindst 6 måneder). De ældre hanner kan være svære at avle på. Hannen skal fjernes fra hunnen senest to uger efter parring. Hanner med unger, skal have helt ro, da de bliver stressede af forstyrrelser. I værste fald kan de finde på at æde deres unger. Drægtighedsperioden er ca. 30 dage, og kuld størrelsen er imellem 2-10 unger (typisk vil de få 4-5 unger). De nyfødte, blinde unger med en vægt på ca. 10 g. er dækket af en tynd membran, som beskytter moderen mod deres bløde pigge, som bliver hårdere allerede et par timer efter fødslen. Øjnene åbnes efter et par uger, hvorefter aktiviteten stiger. I 6-ugers-alderen fravænnedes de moderen. De bør fjernes helt fra moderen i 7-8-ugers-alderen. Ungerne bliver kønsmodne i 2-3-måneders-alderen.



### **TYPISKE TEGN PÅ SYGDOM OG NEDSAT TRIVSEL**

Det første år kan pindsvinet tabe og udskifte sine pigge et par gange, og her kan dyret klø sig, hvilket er normalt. Et bad i lunken kamillete kan evt. lindre kløen. Som voksen taber de sjældent piggene, men sker dette i stor grad, er det et sygdomstegn, og dyrlægen bør opsøges.

Pindsvinet kan let blive overvægtig, så sørg for at give en varieret kost uden meget fedende og sukkerholdige føde. Disse pindsvin kan angribes eller være bærere (uden synlige tegn) af svamp, som kan smitte til mennesker. Det kan være svært for mennesker at slippe af med det, når man først er smittet, så det anbefales at få dyret tjekket hos dyrlægen.

### **ØVRIGE INFORMATIONER**

Afrikansk hvidbuget dværgpindsvin (*Atelerix albiventris*). Findes i mange varianter i fangenskab. Arten er vidt udbredt i Afrika omkring ækvator på typisk på mere åbne og tørre områder som savanne, græsogbusksletter samt afgrøder. Den er ikke truet i naturen.